

スイカ菌核病防除のお知らせ



交配前から果実肥大期に低温・多湿となると菌核病が発生しやすくなります。交配前に防除を行いましょう。

散布剤の使用方法和特性

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	予防効果	治療効果	浸透移行性	ミツバチの 影響日数
カンタスドライフロアブル	1000～1500倍	前日まで	3回以内	◎	△	△	0日
スミレックス水和剤	1000～2000倍	7日前まで	5回以内	○	○	○	1日
ロブラール水和剤	1000倍	前日まで	4回以内	○	○	○	1日
ベルコートフロアブル	1000倍	前日まで	4回以内	○	△	×	0日
スミブレンド水和剤	2000倍	21日前まで	5回以内	○	○	○	1日

くん煙剤の使用方法和比較

薬剤名	使用量	使用時期 (収穫前日数)	総使用回数	くん煙時間	価格 (規格)	1000㎡当り 費用	ミツバチの 影響日数
スミレックスくん煙顆粒	50㎡当り6g (1000㎡当り120g)	7日前まで	5回以内	10～15時間	1,344円 (50g)	3,226円	1日

※スミレックス・スミブレンド・スミレックスくん煙顆粒は同一成分が含まれるので使用回数に注意(総使用回数5回以内)。

※交配前にハダニ類の発生がある場合には、バロックフロアブル(2000倍、前日まで、2回以内)を混用しましょう(ミツバチ影響無し)