

☆☆☆ネギ抽苔時期予測について☆☆☆ 第2回

令和3年4月1日

J A山武郡市

調査協力：山武農業事務所

1. 花芽分化状況調査結果（調査日：3月31日 天気：晴れ）

品種	定植日	育苗方法	花芽分化率 (%)	平均内葉数 (枚)	抽苔予想日 (参考)
春扇	8/下	CP	100	2.4	4月16日
初夏扇	8/下	CP	100	2.2	4月15日
初夏扇	9/上	CP	100	3	4月21日
初夏扇2号	9/上	CP	100	3.8	4月26日
羽緑一本太	9/下	CP	40	3	4月21日


※内葉数は花芽分化株のみの平均値 ※CP；チェーンポット

※抽苔開始予測日は、葉の展開速度を1枚7日で計算

前回調査（2/26）では抽苔速度は『平年並み』とお知らせしましたが、3月以降、気温が平年よりも高くまとまった降雨もあったことから、ネギの生育が進み、3月中旬頃から秋冬ネギでは抽苔している圃場が多くみられました。今回の調査で、春ネギでもほぼすべての圃場で花芽分化が確認されており、内葉数も2~3枚と前回調査よりも『やや早まってきている』状況です。今後も気温が高く推移すると、予測日よりさらに早まる可能性がありますので、注意が必要です。

例年4月以降は、抽苔だけでなく葉の黄変やトロケなどクレームが発生しやすい時期でもあります。掘り置き・作り置きはしない様お願いします。

2. 抽苔時期予測方法



葉の展開速度は

2~3月で10日前後、4月で7日前後

抽苔時期の予測は次の計算式で出ます。

秋冬ネギ（2月調査） 内葉数×10日

春ネギ（3月調査） 内葉数×7日

左の図では3枚×7日で、21日後頃に抽苔が予測されます。