

☆☆☆ネギ抽苔時期予測について☆☆☆ 第1回

令和4年3月4日
JA山武都市

1. 花芽分化状況調査結果（調査日；3月2日 天気；晴れ）

品種	定植日	育苗方法	花芽分化率	平均内葉数（枚）	抽苔開始予想日（参考）
龍ひかり2号	7/上	CP	60%	7	4月29日
龍ひかり2号	7/下	CP	40%	6.5	4月25日
龍ひかり1号	7/下	CP	40%	6.5	4月25日
春扇	7/上	CP	40%	6.5	4月25日
春扇	8/中	CP	60%	6.7	4月26日
初夏扇	7/上	CP	0%	—	花芽未分化


※内葉数は花芽分化株のみの平均値 ※CP；チェーンポット

※抽苔開始予想日は、葉の展開速度を3月は10日/枚、4月は7日/枚で計算

今シーズンは年内から低温が続いたことから、花芽は例年並みに分化しているため、秋冬品種では既に花芽ができていているとさせていただきます。しかし、年明け以降も低温や乾燥が続き、ネギの生育が緩慢であったことから、例年よりも内葉数（ネギの内部に控えている葉）は2枚ほど多くなっています。そのため、抽苔開始予測では昨年より2週間ほど遅くなっていますが、今後の気温上昇に伴い、葉の展開速度が速くなると、予測日より早く抽苔することも考えられますので、晩抽性のない品種については、早めの収穫を心掛けてください。

次回は3月下旬に春ネギ品種を中心に調査を実施します。

2. 抽苔時期予測方法



葉の展開速度は
2～3月で 10日前後
4月で 7日前後

抽苔時期の予測は次の計算式で出ます。
秋冬ネギ（2月調査） 内葉数×10日
春ネギ（3月調査） 内葉数×7日

左の図では3枚×10日（2月調査）ですので、30日後頃に抽苔が予測されます。