


バレイショ生産者 各位

バレイショの防除(疫病、軟腐病対策)について

今年は、例年よりも降雨が多くなっております。

まもなく、収穫を迎える圃場もありますが、疫病・軟腐病の発生が確認されておりますので、天候のタイミングを見計らって、下記薬剤にて防除を実施しましょう。



【バレイショの疫病・軟腐病に登録のある殺菌剤一覧】

薬剤名	使用基準	収穫前日数	使用回数	対象病害		特性
				疫病	軟腐病	
レーバスフロアブル	1500～ 2000 倍	7日前まで	2回以内	●		治療
プロポーズ顆粒水和剤	750～ 1000 倍	7日前まで	5回以内	●		予防 治療
ランマンフロアブル	1000～ 2000 倍	7日前まで	4回以内	●		予防
カスミンボルドー	800 倍	7日前まで	3回以内	●	●	予防 治療
スターナ水和剤	1000 倍	7日前まで	5回以内		●	予防 治療
ジマンダイセン水和剤	400～ 600 倍	7日前まで	10回以内	●		予防

※収穫前日数に注意し、散布を行ってください。

※特に疫病は2～3日の連続降雨により、あっという間に全滅する恐れがあるので、雨続きの場合は必ず薬剤散布をしてください。