


# 【抑制トマト 台風通過後の対策】



台風8号が13日夜に千葉県を通過し、大雨・強風をもたらしました。今後、高温多湿により、病害の発生が懸念されます。また、虫の飛び込みによるウイルス病の持ちこみ（黄化葉巻病など）の拡大も心配されますので、以下の薬剤を早めに散布してください。

## 【殺菌剤（すすかび病、葉かび病、輪紋病対策）】

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数	すすかび病	葉かび病	輪紋病	特性※
アフェットフロアブル	2000倍	前日	3回	○	○		予
パンコゼブフロアブル	1000倍	前日	2回	○	○	○	予
トリフミン水和剤	3000倍	前日	5回	○	○		予・治
ゲッター水和剤	1000倍	前日	5回		○		予・治
ファンタジスタ顆粒水和剤	2000倍	前日	3回	○	○		予・治
カスミンボルドー	1000倍	前日	5回	かいよう病	○	○	予・治

※予：予防、治：治療

## 【殺虫剤（コナジラミ、アザミウマ、アブラムシ、オオタバコガ対策）】

薬剤名	希釈倍率	収穫前日数	使用回数	コナジラミ類	アブラムシ類	アザミウマ類	オオタバコガ
コルト顆粒水和剤	4000倍	前日	3回	○	○		
モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	前日	3回	○	○	○	
ディアナSC	2500倍	前日	2回	○		○	○
マッチ乳剤	2000倍	前日	4回	○		○	○
プレバソンフロアブル5	2000倍	前日	3回				○
アフーム乳剤	2000倍	前日	5回	○			○

◆トマトの樹勢が弱っている場合、メリット青（500倍）または、エバハウソ（1000倍）を散布し、樹勢の回復を促してください。