

台風 14 号の接近に伴う対策について

令和4年 9月16日
J A全農ちば 営農支援部

現在台風14号が発生し、19日～20日にかけて関東地方に接近する恐れがあります（16日8時時点）。台風の影響により圃場の冠水・作物の損傷・高温多湿による病害の発生が予想されますので、対策の徹底をお願いします。

1. 台風対策について

(1) ビニールハウスなど施設の管理

強風によってビニールハウスが損傷する場合がありますので、台風接近前に以下の点をしっかりと確認しましょう。

- ア. ハウスを点検し、破損箇所は補修を行う。
- イ. 戸締りはしっかりと行い、出入り口の扉は強風で外れないよう点検する。
- ウ. 外部と通じている部分（天窓・換気扇・出入り口など）はしっかりと固定する。
- エ. 風に飛ばされたものがハウスを傷つける場合があるので、周辺の資材は片づける。
- オ. 台風通過中に窓が開かないようにするため、自動開閉装置などは電源を切っておく。
- カ. 台風通過後は、ハウスの損傷箇所を確認し、ハウス内が高温になるため換気を行う。

※台風通過中は危険なため、外部で無理な作業を行わない。

(2) 土壌消毒中の圃場は強風により被覆資材が飛ばされないよう、覆土・重しの確認を行いましょ。

(3) 沿岸部では塩害の恐れがあるため、通過後に散水や下記の防除と併せて十分な水を散布することで除塩を行いましょ。

(4) 果樹（梨）では多目的防災網の押え紐を補強しましょ。また棚揺れ防止のため、ブロックや土を入れた肥料袋と棚を紐で結んでおくなどの対策を取いましょ。

(5) 病害の防除

台風による強風で作物に傷がつき、さらに台風後の高温・多湿により病害が発生しやすくなります。露地栽培では圃場の排水性を良くしましょ。施設栽培ではハウスを閉め切るため非常に蒸れます。台風通過後に換気が遅れないよう注意しましょ。

実際に施設が被害にあったら…

甚大な被害が起こった場合には、農林水産省等が支援対策を講じる場合があります。

支援対策を受ける場合には、**災害状況がわかるような写真などが必要**になります。

復旧にむけて、一刻も早く片づけを始めたい状況ではありますが、災害記録を残すようにしましょ。

(6) 品目別の防除薬剤

ア. トマト 葉:葉かび病・す:すすかび病・斑:斑点細菌病・疫:疫病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	対象病害	備考
11	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫前日	4回以内	葉	予防・治療
3	トリフミン水和剤※	3000倍	収穫前日	5回以内	葉・す	予防・治療
7.11	シグナムWDG	2000倍	収穫前日	2回以内	葉・す	予防・治療
24.M1	カスミンボルドー	1000倍	収穫前日	5回以内	斑	予防・治療
40.M5	プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	収穫前日	3回以内	葉・疫	予防・治療

※トリフミンとパンチョ TF は同成分（トリフルミゾール）を含むので総使用回数に注意
（合わせて5回まで）

イ. キュウリ 褐斑病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
M7	ベルコートフロアブル	2000倍	収穫前日	7回以内	予防
9	フルピカフロアブル	2000~3000倍	収穫前日	4回以内	予防
11	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫前日	4回以内	予防・治療
1.10	ゲッター水和剤	1500倍	収穫前日	5回以内	予防・治療

ウ. キャベツ べと病・細菌性病害（黒斑細菌病・黒腐病）

薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	対象病害	備考
プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	収穫14日前	2回以内		予防・治療
リドミルゴールドMZ	1000倍	収穫30日前	3回以内	べと病	予防・治療
レーバフロアブル	2000倍	収穫7日前	3回以内		予防・治療
カスミンボルドー	1000倍	収穫7日前	4回以内※	黒斑細菌病	予防・治療
カセット水和剤	1000倍	収穫7日前	3回以内※	・黒腐病	予防・治療
バリダシン液剤5	800倍	収穫7日前	5回以内	黒腐病	予防・治療

※カスミンボルドーとカセット水和剤は同成分（カスガマイシン）を含むため合わせて4回まで。

エ. ネギ 白絹病・軟腐病・黒斑病・べと病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数 ※	対象 病害	備考
7	アフェットフロアブル	2000倍	収穫前日	2回以内	白絹病 黒斑病	予防
11	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫3日前	4回以内	べと病 黒斑病	予防・治療
24.M1	カスミンボルドー※	1000倍	収穫14日前	2回以内	軟腐病	予防・治療
24.31	カセット水和剤※	1000倍	収穫14日前	2回以内		予防・治療
31	スターナ水和剤※	2000倍	収穫7日前	3回以内		予防・治療
31.M1	ナレート水和剤※	1000倍	収穫14日前	3回以内		予防・治療
40.M5	プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	収穫14日前	3回以内	べと病	予防・治療
4.M3	リドミルゴールドMZ	1000倍	収穫14日前	3回以内		

※カスミンとカセットは同成分（カスガマイシン）を含むため合わせて2回まで、カセット・ナレート・スターナは同成分（オキシリニック酸）を含むため合わせて3回までのため、それぞれ総使用回数に注意。

オ. ナシ 炭そ病

FRAC	薬剤名	希釈倍数	使用時期	使用回数	備考
11	ストロビードライフロアブル	2000倍	収穫前日	3回以内	予防・治療
7・11	ナリアWDG	2000倍	収穫前日	3回以内	予防・治療

※農薬使用時は最新の登録内容を確認し、登録内容を守って使用してください。

(7) 園芸作物施肥（樹勢回復）

被害により樹勢の低下が見られた場合は、葉面散布を活用して樹勢の回復に努めましょう。

液肥例：ポリコープ2号 4－6－6＋微量元素、400～600倍
 キャッチアップ2号 15－30－15＋微量元素、500倍
 野菜の達人 15－14－10、1000倍

●使用時のポイント

- ・5～7日おきに2～3回程度、継続的に散布しましょう。
- ・高濃度の散布は避け、気温の低い午前中に散布しましょう。特に高温（25度以上）、著しく樹勢が低下している場合は濃度を薄くしましょう。
- ・新葉を中心に葉の裏にかかるよう散布しましょう。