

秋冬ニンジンの 黒葉枯病・害虫対策

令和4年9月
JA山武郡市
(第1号)

8月中旬より、ゲリラ雷雨が発生しており、地表面が固まっています。畝間に管理機を通すか、株が小さい場合は、条間に中耕除草機（例：「たがやすくん（写真右）」など）を通し、土壌の通気性を確保してください。



中耕除草機（たがやすくん）

今後、黒葉枯病等の発生が懸念されます。害虫の発生も散見されますので、下記薬剤を参考に防除を行いましょう。

【黒葉枯病防除】

薬剤名	特性	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
Zボルドー	予防	500倍	—	—
ベルコート水和剤	予防	500～1000倍	14日前まで	5回以内
カスミンボルドー	治療	1000倍	14日前まで	2回以内
ポリオキシシン AL 水和剤	治療	500倍	7日前まで	5回以内

【害虫防除】

薬剤名	対象害虫	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
アフーム乳剤	ハスモンヨトウ	2000倍	前日まで	3回以内
フェニックス顆粒水和剤	ヨトウムシ	2000～4000倍	前日まで	2回以内
ゼンターリ顆粒水和剤	ハスモンヨトウ	1000倍	前日まで	制限なし

☆雑草が残った圃場ではニンジン本葉3～5枚時にコロックス（100～150g/10a（70～150ℓ/10a）、収穫30日前まで、1回）を散布しましょう