

# 生産日誌

氏名、生産者番号を記入しましょう。  
 ※氏名がスタンプの場合は押印が必要。

## JA山武郡市 令和6年産 ネギ [作型：(秋冬)・春] 栽培管理記録簿

※作型に○印を記入してください。

氏名	フリガナ /ウキョウ /アロウ 農加 太郎 自署または記名押印	生産者番号	00-12345
私は、本栽培管理記録簿に記入した個人情報について、貴組合が下記の利用目的の範囲内で提供することに同意します。 ★利用目的 ●JA、JA全農ちばの提供する商品・サービスに関する情報の提供等 ●業務遂行に必要な範囲で行う関係団体、取引先等への提供			

圃場名 (番号または略称)	家の裏	面積	10a
圃場の所在地 (住所)	千葉県山武市和田 375-2		
品種名	夏扇4号		
播種日	5月 1日		
育苗方法	チェーンポット・プラグ苗・大苗・その他( )※○印をつける。		
定植日	6月 10日		
定植方法	(ひっぱり君) 機械植え・手植え・その他( )※○印をつける。		
収穫開始日	12月 20日 (予定日: 12月25日)		

資材名		月/日			
培土		/			
		/			
資材名		月/日			
土づくり	完熟堆肥	/			
	緑肥( )	/		kg	
		/		kg	
基肥		/		kg	
	粒状セルカ	6/1		80 kg	
	マルチサポート2号	6/1		60 kg	
	苦土重焼燐	6/1		40 kg	
	さんぶ葱スペシャル	/		kg	
	さんぶジシアン有機特806	6/10		30 kg	
葉面肥 散布 剤は	さんぶジシアン有機特806	7/15	20 kg	9/10	40 kg
		10/30	40 kg	11/20	40 kg
		/		/	kg
		/		/	kg

圃場名や圃場の所在地、面積など  
栽培概要を記入しましょう。

※この記録簿は、JA山武郡市 取り扱い販売に関わる場合のみに適用します。  
 ※すべてボールペンで記入してください。

山武緑の風 品目コード記入欄
品目名
コード

使用した資材名や施肥日、施用量  
を記入しましょう。

(栽培基準)トレーサビリティへの取組
改正年月日 令和6年2月13日
生産行程 JA山武郡市
確認 営農部
責任者 営農振興課
TEL0475-82-3531

全てのページに氏名、生産者番号、圃場名  
を記入しましょう。

**防除日誌**

JA山武郡市 令和6年産 ネギ 圃場名: (秋冬・春)【防除日誌 殺虫剤②】

生産者名: 農協 太郎		生産者番号: 00-12345		圃場名: 家の裏						
対象病虫害 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ ネキリムシ類 シロイチモジヨトウ ネギコガ ネダニ類	成分系	使用農薬		使用基準		使用回数				
		薬剤名	成分	希釈倍数 または 使用量 (10a当り)	使用時期 (収穫前 日数)	総 使用 回数	1回目	2回目	3回目	4回目
●●	ネ	ダントツ粒剤	クロチアニジン	3~6kg	3日前迄	4回	粒	粒	粒	粒
●●	ネ	ダントツ水溶剤	クロチアニジン	2000~4000倍	3日前迄	4回	/	/	/	/
●●	ス	ディアナSC	スピネトラム	2500~5000倍	前日迄	2回	/	/		
						2回	/	/		
						2回	/	/		
						2回	/	/		
						2回	/	/		
						3回	/	/	/	
						1回	/			
						3回	/	/	/	
●●	ジ	ブリロツン粒剤オメガ	シアントラニブロール	6kg	前日迄	3回	○	○	○	定植後3回以内
●●	ジ	ベネビアOD	シアントラニブロール	2000倍	前日迄	3回	7/20	/	/	
●●	ジ	ベリマークSC	シアントラニブロール	400倍	育苗期後半~定植当日	1回	○	○	○	育苗トレイ1箱当り0.5L灌注
●●	1	マッチ乳剤	ルフェヌロン	2000倍	7日前迄	3回	/	/	/	
●●	有	マラソン乳剤	マラソン	1000~3000倍	7日前迄	6回	/	/	/	
●●	ネ	モスピラン顆粒水溶剤	アセタミプリド	2000倍	7日前迄	3回	/	/	/	
●●	他	リーフガード顆粒水和剤	チオシクラム	1500倍	7日前迄	2回	/	/		
●●		ヨバドールフロアグレ	テトラヒドロピロール	2500~5000倍	3日前迄	3回	10/15	/	/	
							/	/	/	

農薬を散布したら、その日のうちに散布日を  
記録しておきましょう。  
同成分を含む農薬がある場合は該当する  
方に○印を記入しましょう。

★成分系は以下のとおりです。  
ス:スピノシン系 合:合成ピレスロイド系 オ:オニコチノイド系 I:IGR 有:有機リン系 他:その他  
★収穫開始後に薬剤を散布する場合、収穫前日迄に○印をつけてください。  
※上記以外の適用範囲は、各薬剤の添付資料を参照してください。  
※この記録簿は、1圃場1年1回記入してください。

確認日	
確認者印	

《記録簿に記載のない農薬を使用している場合》

●正式な薬剤名、成分名、使用基準(希釈倍数など)  
を記入しましょう。

※同成分を含む農薬の総使用回数に注意!

# 防除日誌

例

●	予・治	オロンディスウルトラSC	オキサチアピプロリン +マンジプロバミド	2000倍	7日前迄	2回	オ	オ		
●	予・治	レーバフロアブル	マンジプロバミド	2000倍	7日前迄	2回	レ	レ		
●	予・治	カスミンボルドー	カスガマイシン +銅	1000倍	14日前迄	2回	レ	レ		
●●●●●	予	カナメフロアブル	インピルフルキサム	4000倍	前日迄	4回	レ	レ	レ	レ
●●●●●	予・治	アミスター2070アブル	アゾキシストロピン	2000倍	3日前迄	4回	レ	レ	レ	レ
●●●●●	予・治	ユニフォーム粒剤	アゾキシストロピン +メタラキシルM	9kg	45日前迄	1回	レ	レ	レ	土寄せ時、株元土壤混和
●●●●●	予・治	モンガリット粒剤	シメコナゾール	4~6kg	14日前迄	3回	7/15	10/25	レ	シメコナゾール 合計3回迄
●●●●●	予・治	テーク水和剤	シメコナゾール +マンゼブ	600倍	14日前迄	3回	9/18	10/23	レ	マンゼブ 合計3回迄
●●●●●	予	ジマンダイセン水和剤	マンゼブ	600倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	マンゼブ 合計3回迄
●●●●●	予	ベンコゼブフロアブル	マンゼブ	500~ 600倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	マンゼブ 合計3回迄
●●●●●	予・治	リドミルゴールドMZ	マンゼブ+ メタラキシルM	1000倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	メタラキシル 散布は合計3 回迄
●●●●●	予・治	フォリオゴールド	メタラキシルM +TPN	800~ 1000倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	メタラキシル 散布は合計3 回迄
●●●●●	予・治	プロボーズ顆粒水和剤	TPN+ベンチアピリカ スイノフロピル	1000倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	TPN散布は 合計3回迄
●●●●●	予	ダコニール1000	TPN	1000倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	TPN散布は 合計3回迄
●●●●●	苗立枯病	予	ダコニール1000	500倍	14日前迄	3回	レ	レ	レ	1㎡当り希釈液 0.5ℓ 土壌灌注
●●●●●	予・治	スターナ水和剤	オキシリニック酸	200倍	14日前迄	3回	ス	ス	ス	オキシリニッ ク酸で合計3 回迄
●●●●●	予・治	ナレート水和剤	オキシリニック酸 +有機銅	200倍	14日前迄	3回	ス	ス	ス	オキシリニッ ク酸で合計3 回迄

～同成分を含む農薬の使用回数について～

この場合、シメコナゾールを含む農薬を3回使用してしまっているため、モンガリット粒剤とテーク水和剤はもう使用できません。

また、テーク水和剤はマンゼブの成分も含んでいるため、マンゼブを含む農薬もあと2回しか使用できません。

※使用日を書く残りの欄を塗りつぶしておくこと、誤使用防止につながります。